



Informatie voor konijnenbaasjes: terug voor sterilisatie

Wat fijn dat je een konijn bij DOA hebt geadopteerd. Het vrouwtje dat je hebt geadopteerd was nog te jong voor sterilisatie. Daarom vragen we je met klem om daarvoor terug te komen. We leggen hier uit waarom, en hoe je goed voor je konijn zorgt voor en na de operatie.

In dit infopakket:
Waarom steriliseren
Afspraak voor sterilisatie
Vorbereiding op de operatie
Thuiskomst
Medicatie
Medicatie dwangvoeren
Herkoppelen

Waarom sterilisatie een leven kan redden

Natuurlijk is een belangrijke reden voor sterilisatie het voorkomen van nog meer tamme konijnen. Als je ziet hoeveel dieren in ons asiel belanden, dan snap je waarom. Maar misschien nog wel belangrijker is dat veel

Sterilisatie is gratis

ongesteriliseerde konijnen rond het zesde levensjaar tumoren of andere problemen in de baarmoeder krijgen. Soms ontdek je dat te laat en is opereren niet meer mogelijk. En sowieso is een operatie voor een wat ouder konijn ingrijpender dan voor een jong konijn. Tot slot komt sterilisatie de band tussen de konijnen vaak term goede, omdat het vrouwtje minder last heeft van hormonen. Alle reden dus om je konijn terug te brengen naar DOA voor sterilisatie.

Afspraak voor sterilisatie

Vrouwtjes kunnen vanaf 6 of 7 maanden gesteriliseerd worden. De sterilisatie van jouw konijn is rond die leeftijd ingepland bij de DOA-dierenarts. Die datum krijg je mee bij de adoptie. We verwachten dat je op die dag je konijn om 9.00 uur brengt. Je kan haar dan vanaf 14:00 uur weer ophalen. Mocht die dag je niet uitkomen, bel dan even met de dierenarts. Onze dierenarts is bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 10:00 - 10:30 uur en tussen 15:00 - 15:30 uur via het algemene nummer, 020 - 740 22 22.

Vorbereiding op de operatie

Op de dag van de operatie geef je je konijn brokjes, hooi en een groente zoals normaal. Je kan eventueel een druppel Bach bloesem (voor dieren) in de nek geven, of iets anders doen dat je konijn ontspant. Voor en na de operatie zit je konijn in het reismandje, je wil dat natuurlijk zo comfortabel mogelijk maken. Vouw een grote handdoek op maat en leg die op de bodem, zodat ze op reis en na de operatie niet uit kan glijden. Doe er geen hooi of waterbakje in. Zorg dat je de favoriete groenten, kruiden en snacks van je konijn in huis hebt. Neem daar wat van mee in een zakje/wegwerpbakje met de naam van je konijn erop.

DOA steriliseert alle
asielkonijnen, daar hebben we
dus enorm veel ervaring mee!

Als je konijn straks thuiskomt kan het nodig zijn om haar apart te zetten van haar vriendje. Je kunt dit zelf het beste inschatten. Denk je dat je andere konijn achter haar aan gaat rennen, dan is het beter om ze apart te zetten. Bij voorkeur zo dat ze wel bij elkaar kunnen zitten, maar dan met een hekje ertussen. Dit maakt herkoppelen straks gemakkelijker. Zorg dat ze een fijn schuilplekje heeft, want dat is extra belangrijk als ze zich niet lekker voelt. Leven je konijnen buiten en is het koud, maak dan een tijdelijk verblijf binnen. Je kan ook al een stukje brood lagen drogen, om straks te gebruiken om de medicatie te geven.

Wat veel konijnen lekker vinden:

- Peterselie, dit stimuleert de darmwerking en is ontstekingsremmend
- Witlof, zo krijgt het konijn goed vocht binnen.
- Wortelloof
- Erwtenvlokken, dit levert veel energie en eiwit, dat is goed voor herstel
- Kruidenhooi. Het is natuurlijk goed als konijnen zo snel mogelijk weer hooi eten. Met kruidenhooi kun je dat goed op gang brengen.

Thuiskomst

Je konijn zal bij thuiskomst nog slaperig zijn en wankel op de pootjes. Zet de reismand in de ren en doe het deurtje open. Laat haar zelf bepalen wanneer ze naar buiten komt. Pak haar niet op, dan kun je haar ook niet per ongeluk pijn doen. Je konijn heeft een ingrijpende operatie gehad, het duurt gemiddeld een week voor ze grotendeels is hersteld. Voor goed herstel zijn drie dingen belangrijk:

1. **Warmte.** Een konijn dat is geopereerd heeft zelf even wat minder energie om zich warm te houden. Zorg daarom dat ze op een warm, tochtvrij plekje zit. Je hoeft de kamertemperatuur daarvoor niet op te stoken. Leg een fleecedekentje over een handdoek en hang een handdoek of fleecedekentje over een renhekje zodat ze daar onder kan gaan zitten als ze wil. Check af en toe even of ze warm is: leg je vinger in haar nek (het holletje achter haar kop). Als dat warm voelt, dan gaat het goed.
2. **Eten.** Het is belangrijk dat je konijn weer snel eet, zodat de darmen op gang blijven. Eet ze niet, dan kan het nodig zijn om haar apart te zetten, zodat de lekkere hapjes niet door de ander worden opgegeten.
3. **Rust.** Het is belangrijk dat je geopereerde konijn de eerste week niet hoeft te rennen, zodat haar buikwond kan genezen. Als ze te vroeg meer beweegt dan ze zelf wil, dan heb je kans dat er intern littekenweefsel ontstaat waar ze de rest van haar leven last van heeft. Dit zal jij vermoedelijk niet zien, maar zij wel voelen.

Medicatie

Je krijgt van de dierenarts spuitjes mee met medicatie en instructie wanneer je dat moet geven. Meestal is dat:

- dezelfde avond Emeprid en Laxatract, beide bevorderen de darmwerking.
- volgende ochtend: Emeprid en Laxatract, én pijnstilling

- die avond: nog een keer Emeprid en Laxatract. Dit is om de darmen weer op gang te brengen.

Daarna hebben de meeste konijnen geen medicatie meer nodig. Test even of ze al brokjes wil eten. Als dat zo is, dan kun je de medicatie over de brokjes spuiten. Anders kun je testen of ze een stukje droog brood of iets anders aanneemt. Dan kun je de medicatie daarover spuiten. Wil ze bijna niets eten, dan zul je de medicatie in het bekje moeten geven. Eet ze helemaal niets, dan moet je ook dwangvoeren. Blijft ze een dag of twee na de operatie slecht eten, dan heeft ze vermoedelijk nog pijn. Neem dan voor overleg even contact op met de dierenarts.

Medicatie dwangvoeren

Als het konijn niet wil eten, zorg dan dat het wél haar medicatie binnenkrijgt, want de medicatie



is dan juist heel belangrijk! Je kan de medicatie in het bekje spuiten. Hier vind je een [filmpje](#) (klik of scan de QR-code) van hoe je een konijn dwangvoert; met medicatie gaat dat op dezelfde manier. Tijdens het toedienen is het belangrijk om zoveel mogelijk stress te vermijden. Hoe rustiger, geduldiger én kordater jij bent, hoe beter het zal gaan. Om dit te doen, moet je haar

vermoedelijk toch oppakken. Doe dat extra voorzichtig, met 1 hand onder het kontje en 1 hand op de borst bij de voorpoten. Hier vind je een [voorbeeld](#).



Herkoppelen

Als je konijnen niet samen hebben gezeten, kun je ze na een week herkoppelen. Maak ergens een neutrale ren op een plek waar geen van beide nog is geweest. De ren is bij voorkeur iets van drie vierkante meter, en bevat een waterbak, toilet en schuilplek, allemaal schoongemaakt met azijn en zo ontdaan van geuren. Zorg dat je de tijd hebt, want in het begin zul je er waarschijnlijk bij moeten blijven. Gooi in het midden wat lekker kruidenhooi of heleboel andere hele kleine hapjes. Ga met je konijnen in de ren. Spreek ze positief toe, probeer veel te aaien, en als ze bij elkaar zitten, tegelijk te aaien. Geef ze positieve ervaringen. Kom snel tussenbeide als ze gaan vechten. Met een ovenwant bescherm je je eigen handen. Zijn ze niet al te vriendelijk tegen elkaar, dan kun je proberen of het helpt als je ze samen in een reismandje doet, waarmee je dan even door het huis loopt. Zo nemen ze elkaars geur meer aan, en door de stress zoeken ze vaak steun bij elkaar. Als het niet lekker gaat, probeer het dan gewoon over een paar dagen nog een keer. Lukt het dan nog steeds niet, neem dan contact met ons op voor advies.

(katten@doamsterdam.nl).